

BABY VIG

UNA TURBA EN ARMONIA CON LA NATURALEZA DE LOS LECHONES

COBERTURA DE LAS NECESIDADES

- Es notorio que los oligoelementos convencionales (sulfatos y óxidos) son muy poco o nada biodisponibles durante las dos o tres primeras semanas de vida del lechón.
- **BABY VIG** contiene únicamente oligoelementos protegidos.
- **BABY VIG** es consumido desde el primer día y aporta cada día de 6 a 7 mg de hierro, bien absorbidos, que cubren las necesidades diarias del lechón.

FUENTES DE HIERRO PARA LOS LECHONES

• Al nacimiento	50 mg
• Leche de la madre	20 a 30 mg
• Inyección (activo durante 5 días)	100 mg
• Baby vig	100 a 150 mg
• Total	270 a 330 mg

Un litro de **BABY VIG** consumido en 14 días por cada lechón aporta:

10 mg de cobre (0,7 mg / día)
10 mg de magnesio (0,7 mg / día)
40 mg de zinc (2,8 mg / día)

TRANSITO INTESTINAL

- **BABY VIG** contiene el 20% de celulosa sobre la materia seca, necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo del intestino.
- El lastre y entorpecimiento disminuyen la velocidad del tránsito digestivo y los nutrientes aportados por la leche son mejor digeridos.
- Con **BABY VIG** los lechones están más sanos y las heces son más firmes y están menos expuestos a sufrir diarreas.

DEFENSA INMUNITARIA

- El pH natural del **BABY VIG** es de +/- 3,5, acidificando el medio intestinal y disminuyendo la agresión de gérmenes contra los lechones sin defensas.

INICIACIÓN AL CONSUMO PRECOZ DE ALIMENTO SÓLIDO

- **BABY VIG** es un producto semihúmedo y es consumido por el lechón desde el primer día de vida lo que le permite absorber la humedad del producto (65%). Los alimentos mezclados con **BABY VIG** a partir del 5º o 6º día son mejor digeridos sin causar trastornos digestivos.

MODO DE EMPLEO

- **BABY VIG** se distribuye tres veces al día sobre el suelo o en un comedero adaptado a los lechones.
- Desde el primer día un puñado o medio litro de **BABY VIG** por camada.
- En el 5º o 6º día cuando estemos aportando un litro de **BABY VIG** por camada ya podemos aportar el pienso pre-starter.
- Si las cerdas no tienen suficiente leche podemos utilizar el **BABY VIG** como soporte para mezclar la leche maternizada el polvo.
- Alrededor de la tercera semana, cuando los lechones consumen suficiente alimento pre-starter podemos retirar progresivamente el **BABY VIG**.

BABY VIG

COMPLEMENTO ALIMENTARIO SEMIHÚMEDO PARA LECHONES

Oligoelementos protegidos aportados por litro de **BABY VIG**:

Hierro.....	100 mg	Materia seca.....	5 a 35%
Zinc.....	40 mg	Ph	/- 3,5
Manganeso.....	10 mg	sobre M.S. : fibra	0 a 22%
Cobre.....	10 mg	Cenizas	5%

IPEC
IMPORTACIONES
PECUARIAS
CENTRO

Importaciones Pecuarias Centro S.L.

C/ Gremio de los Metalúrgicos, 54. Pol. Ind. Hontoria
40195 - Hontoria - Segovia ☎ (+34) 921 447 213