

BREIZ Agno



Pienso completo de lactancia para corderos y cabritos.

COMPOSICION:

Leche desnatada en polvo - Suero de leche - Aceite de colza - Aceite de palma - Aceite de coco - Harina de trigo - Gluten de trigo - Almidón de trigo - Carbonato de calcio - Sulfato de magnesio - Hidróxido de magnesio.

CONSTITUYENTES ANALITICOS:

ADITIVOS (/Kg):

Proteína bruta Materias grasas brutas	24 % 24 %	Antioxidante B.H.T. 48 r	ng
Celulosa bruta	5 %		
Cenizas brutas	7 %	Vitaminas	
Calcio	0.90 %	Vitamina A (Acetato de retinilo) 25000	UI
Sodio	0.45 %	Vitamina D3 2000) UI
Fósforo	0.75 %	Vitamina E (acetato de todo-rac-α- tocoferilo) 50	mg
1 031010	0.75 70	Vitamina K3	mg
		Vitamina B1 15 i	mg
		Vitamina C (L-ácido ascórbico) 75 r	ma

OLIGOELEMENTOS

Hierro (sulfato monohidratado) 37 mg Cobre (sulfato pentahidratado) 2 mg Zinc (sulfato monohidratado) 62.5 mg Manganeso (sulfato monohidratado) 50 mg Iodo (yodato de calcio anhidro) 0.25 mg Selenio (selenito de sodio) 0.1 mg

MODO DE EMPLEO

Iniciar la lactación con un aporte suficiente de calostros.

Es posible su utilización en cubo con tetina o en máquina nodriza.

Dosificación para corderos: 200 g por litro de agua a 50-55°C y distribución a voluntad con tetina.

Dosificación para cabritos: 170 g por litro de agua a 50-55°C y dsitribución a voluntad con tetina.

En condiciones de temperatura aceptables, adminis-

trar a temperatura ambiente.

ACONDICIONAMIENTO

Saco de papel kraft (de doble espesor) forrado interiormente con polietileno. Saco de 25 kg sobre pallets no recuperables de 1.250 kg



Importaciones Pecuarias Centro, S.L. Gremio del Cuero, 10 40195 Hontoria - Segovia Telf: +34 921 447 213 administracion@ipeccentro.com Distribuído por: